

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Adrenalin

Henvender sig til: Social og sundheds assistenter og sygeplejerske.

Formål: At kunne iværksætte omgående behandling af alvorlige komplikationer (anafylaktisk shock) opstået i tilslutning til indgift af et lægemiddel.

Anafylaktisk shock:

Kan opstå når der gives:

- Medicin, både pr. os, alle former for injektioner.
- Vacciner.
- Fødevarer.

Symptomer:

Fra mild kløe, snurren i læber, lokale ødemer, udslæt til udsættende puls og respiration.

Forvarsel:

- Almen utilpashed.
- Vejtræknings besvær.
- Grå, bleg kulør.
- Svimmelhed.
- Svedudbrud – koldsved.

Akutte symptomer:

- Luftveje: Snue, cyanose, stridor (hivende, besværet vejtrækning) pga. bronkospasmer / lungeødem. Respirationsstop.
- Mave/tarm kanal: Smarter, kvalme, opkastning, diaré.
- Kredsløb: Varm / kold hud, hypotension. Hjertestop.
- Huden: Kløe, quinckes ødem (ødem i underhud og slimhinder) eksantem (udslæt)
- CNS (central nervesystem) : Sløret sensorium, kramper, bevidstheds tab, ekskretafgang.

Behandling:

Ved milde symptomer:

Adrenalin 1 mg /ml – der skal gives 0,5 – 1 mg pr. gang.

Hvis der er milde symptomer efter injektion, gives adrenalin injektionen tæt på injektionsstedet, intramuskulært. Dels for at modvirke optagelse af det allergifremkaldende præparat, dels for at modvirke det allergiske shock.

Se procedure for intramuskulær injektionsgivning.

Umiddelbart herefter skal læge kontaktes, eller om nødvendigt skal der rekvireres en

ambulance.

Hvis beboerens tilstand ikke efter nogle minutter er blevet væsentligt bedre, kan det være nødvendigt at gentage injektionen med endnu en intramuskulær injektion af samme dosis adrenalin.

Ved akutte symptomer:

Giv injektion med adreanlin tæt på injektionsstedet, intramuskulært. Dels for at modvirke optagelse af det allergifremkaldende præparat, dels for at modvirke det allergiske shock.

Læge tilkaldes – 112

Trendelenburg leje (Benene op og hoved nedad.)

Mål værdier.

Blev hos beboer.

Opbevaring af akut kassen til adrenalin:

Skal opbevares på køl. Hvis adrenalin ampullen ikke opbevares på køl, er holdbarheden 6 mdr. Hvis den opbevares på køl, er holdbarheden den dato der er angivet på ampullen.

I kassen skal være:

- Ampul med adrenalin.
- To 1 ml. sprøjter.
- To lyserøde kanyler.
- To blå kanyler.
- To grønne kanyler.
- Swabs.
- Plaster.

Det er gruppelederen der er ansvarlig for dette forefindes, og sikrer adrenalin ampullen ikke er udløbet.

http://www.sst.dk/publ/vejledninger/03/allergisk_shock.pdf

Udsendt første gang:

20.06.11

Revideret:

21.06.16

Denne udgave er lagt på

www.plejebolig.albertslund.dk
og gældende fra:

21.06.16

SB-SYS: Procedurer