

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Intra muskulær injektion

Henvender sig til: Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Formål: At der arbejdes ud fra de samme principper og teknikker ved intramuskulær injektion. Samt at injektionen gives sikkert og forsvarligt.

Injektion

Der kan ved i.m injektion gives:

1-2 ml eller
4-5 ml i stor muskel.

Det skal du bruge:

- Sprøjte
- Grøn eller blå kanyle
- Lyserød kanyle
- Kanylebøtte.
- Handsker.
- Sprit serviet
- Evt. plaster.
- Adrenalin (se procedure på dette)

Indstiksteder:

- Hoften - musculus gluteus maximus
- Låret - musculus vastus lateralis
- Skulderen - musculus del toidelus

Se på medicinskema og tjek præparatet for navn og styrke samt udløbsdato.
Informér borger.

Find egnet sted til injektionen på beboeren se ovenfor. Huden skal være hel.

1. Vask hænder.
2. Tag handsker på.
3. Træk præparatet op med lyserød kanyle.
4. Lyserød kanyle kommes i kanylebøtte.
5. Grøn / blå kanyle på sættes sprøjten tag ikke beskyttelses hættten af endnu.
6. Sprit huden af på borgeren.
7. Tag beskyttelseshættten af kanylen.
8. Tag med den ene hånd greb om injektionsstedet og stræk huden ud.
9. Hold sprøjten mellem pege - og tommel finger.
10. Stik kanylen ind så dybt som muligt.
11. Aspirer i 5- 10 sek. (Sikre den ikke er i et blodkar) Hvis der aspireres blod træk kanylen ud og start ved punkt 3.

12. Injicer præparatet – 10 sek. pr ml.
13. Vent 10 sek. og træk kanylen ud.
14. Sæt evt. plaster på injektionsstedet.

Observer efterfølgende:

Lokal reaktion, lille allergisk reaktion med rødme omkring indstiksstedet. Blødning.
Systemisk reaktion – obs anafylaksi. (se instruks for brug af adrenalin)

Udsendt første gang: <input type="text" value="02.10.12"/>	Revideret: <input type="text" value="18.07.16"/>	Denne udgave er lagt på www.plejebolig.albertslund.dk og er gældende fra <input type="text" value="18.07.16"/> SB-SYS: Procedurer
---	---	--