

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Sugning i øvre luftveje.

Henvender sig til

Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og oplærte social- og sundhedshjælpere.

Formål

At opnå viden om sugning i øvre luftveje samt sikre en ensartet metode til denne kliniske sygeplejehandling.

At sikre at de øvre luftveje holdes frie.

Sekretet kan fjernes ved direkte sugning i munden og øvre del af svælget eller igennem næsen.

Sugning i øvre luftveje kan irritere næseslimhinden, give kvælningssensation og give hoste.

Du skal bruge:

- Sugeapparat, med suge-slange, og Y-rør.
- En kande med vand.
- Suge kateter.
- Handsker.

Forberedelse:

- Du skal overveje om beboeren skal have smertestillende inden.
- Du skal overveje om i skal være to personer tilstedes.
- Informer beboeren
- Sæt evt. en pose i suge beholderen.
- Sæt et suge kateter på y-røret, lad kateteret blive i "posen" så det ikke forurennes.
- Hjælp så vidt muligt beboeren op i siddende stilling.
- Du skal tage handsker på.
- Suge kateteret fugtes i kanden med vand.
- Suge kateteret føres forsigtigt ind i mundhulen og højst til lige efter drøblen, eller 6-10 cm i næsehulen, uden vakuum er aktiveret.
- Du suger ved at placere en finger "sugehullet" og rotere kateteret.
- Sug ikke når kateteret trækkes ud.
- Processen må max tage 15 sek. kan evt. gentages.
- Suge slangen skylles igennem, og kateteret kasseres.

Rengøring:

- Suge kateter er til engangs anvendelse.
- Du skal sikre dig at suge slangen er skyllet ren.
- Y-rør og slangen kan anvendes i 30 dage.
- Tøm suge beholderen efter hver anvendelse.
- Suge beholderen skal vaskes af i vand sæbe 1 gang om ugen.
- Bakterie filtret kan holde i 2 måneder. Det skal kasseres straks hvis det er misfarvet.

Udsendt første gang: <input type="text" value="23.08.16"/>	Revideret: <input type="text"/>	Denne udgave er lagt på www.plejebolig.albertslund.dk og gældende fra: <input type="text" value="23.08.16"/> SB-SYS: Procedurer
---	------------------------------------	--